


De Klouschtergaart


Graines et tubercules de plantes utiles
et de légumes oubliés





SOMMAIRE

ATRIPLEX HORTENSIS VAR. RUBRA MELDE ARROCHE DES JARDINS	05
ATRIPLEX HORTENSIS MELDE ARROCHE DES JARDINS	05
OENANTHE SILAÏFOLIA ERDKASTANIE CHÂTAIGNE DE TERRE	06
CHENOPODIUM NUTTALIAE HUAZONTLE CHÉNOPODE DE BERLANDIER	06
CUCUMIS SATIVUS GURKE CONCOMBRE	07
CUCURBITA FICIFOLIA FEIGENBLATTKÜRBIS COURGE DE SIAM	07
TRITICUM AESTIVUM SSP. SPELTA DINKEL ÉPEAUTRE	08
TRITICUM AESTIVUM SSP. SPELTA DINKEL ÉPEAUTRE	08
TRITICUM AESTIVUM SSP. SPELTA DINKEL ÉPEAUTRE	09
VICIA FABA PUFFBOHNE FÈVE	09
PHASEOLUS VULGARIS STANGENBOHNE HARICOT À RAMES	10
PHASEOLUS VULGARIS STANGENBOHNE HARICOT À RAMES	10
PHASEOLUS VULGARIS STANGENBOHNE HARICOT À RAMES	11
PHASEOLUS VULGARIS STANGENBOHNE HARICOT À RAMES	11
LACTUCA SATIVA SALAT LAITUE CULTIVÉE	12
LACTUCA SATIVA SALAT LAITUE CULTIVÉE	12
LACTUCA SATIVA SALAT LAITUE CULTIVÉE	13
LACTUCA SATIVA SALAT LAITUE CULTIVÉE	13
MELISSA OFFICINALIS ZITRONENMELISSE MÉLISSE OFFICINALE	14
CUCUMIS MELO ZUCKERMELONE MELON	14
PANICUM MILIACEUM RISPEHIRSE MILLET COMMUN	15
OXALIS TUBEROSA OCA OCA DU PÉROU	15
ALLIUM X PROLIFERUM ETAGENZWIEBEL OIGNON ROCAMBOLE	16
HORDEUM VULGARE GERSTE ORGE COMMUNE	16
PASTINACA SATIVA PASTINAKE PANAIS	17
CAPSICUM ANNUUM CHILI PIMENT	17
CAPSICUM ANNUUM PAPRIKA PIMENT	18
RAPHANUS SATIVUS VAR. SATIVUS RADIESCHEN RADIS	18
RUTA GRAVEOLENS WEINRAUTE RUE OFFICINALE	19
SCORZONERA HISPANICA SCHWARZWURZEL SCORSONÈRE D'ESPAGNE	19
CYPERUS ESCULENTUS ERDMANDEL SOUCHET COMESTIBLE	20
SOLANUM LYCOPERSICUM TOMATE TOMATE	20
SOLANUM LYCOPERSICUM TOMATE TOMATE	21
SOLANUM LYCOPERSICUM TOMATE TOMATE	21
SOLANUM LYCOPERSICUM TOMATE TOMATE	22
SOLANUM LYCOPERSICUM TOMATE TOMATE	22
SOLANUM LYCOPERSICUM TOMATE TOMATE	23
SOLANUM LYCOPERSICUM TOMATE TOMATE	23
PHYSALIS PHILADELPHICA TOMATILLO TOMATILLE	24
PHYSALIS PHILADELPHICA TOMATILLO TOMATILLE	24
ANREDERA CORDIFOLIA BASELKARTOFFEL VIGNE MADÈRE	25



Hauteur de croissance

Espacement des plantes

Espacement des lignes

Profondeur de semis

ARROCHE DES JARDINS | ATRIPLEX HORTENSIS VAR. RUBRA

ROTE GARTENMELDE | GA-M/R/001

Plante très ancienne. Encore cultivée dans les champs jusque dans les années 1950-1960. Feuilles rougeâtre foncé et tiges vertes présentant des stries pourpre-rougeâtre de bas en haut. Atteint jusqu'à 3 m de hauteur lors de la floraison. Simple à cultiver. Possibilité d'auto-ensemencement.



0.5cm 30cm 6cm 200cm

JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

ARROCHE DES JARDINS | ATRIPLEX HORTENSIS

EPINARD ANCIEN DE MONTHEY | GA-M/E/001

Également appelée « faux épinard » ou « bonne-dame ». Provient de nos jours d'un jardin situé à Monthey en Suisse occidentale. Variété originaire du village de Champéry situé à 1050m d'altitude, puis amenée à Monthey à 400m d'altitude à partir de 1940. Les lantes peuvent atteindre une hauteur d'env. 180cm. L'espèce produit de nombreuses tiges latérales. Sur la branche principale, les feuilles sont assez grandes et font jusqu'à 30cm de longueur. Sur les branches latérales, les feuilles sont plus petites avec env. 15-20cm de longueur. Les feuilles sont légèrement cloquées, et ont une couleur allant de vert pâle à jaunâtre.



0.5cm 30cm 6cm 200cm

JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Récolte/Floraison

Plantation

Semis direct

Préculture

CHÂTAIGNE DE TERRE | OENANTHE SILAÏFOLIA

OHNE NAME NR 004 | ER-K/O/002

La châtaigne de terre est originaire du sud de l'Europe. Cette variété donne des tubercules oblongs très nourissants. Botte de racines tubéreuses ayant la taille d'une arachide. Croissance abondante. Plante sauvage vivace qui ressemble au persil. La récolte se fait à l'automne la deuxième année. Les tubercules peuvent être consommés crus ou cuits. Utiliser les feuilles comme du persil, bien qu'elles aient un goût moins prononcé. Fleurs blanches. Les fleurs apparaissent entre juin et juillet. Croissance vers le haut allant jusqu'à 100 cm. Plante robuste facile à cultiver.



CHÉNOPODE DE BERLANDIER | CHENOPODIUM NUTTALIAE

OHNE NAME NR 040 | HUA/O/001





Type de chénopode ancien et traditionnel originaire du Mexique. Jolie couleur rouge-brun à maturation. Utilisation des feuilles comme des épinards, ou cuites avec une sauce tomate épicée. Légère saveur de noisette. Atteint env. 140 cm de hauteur. Pousse également dans des endroits semi-ombragés.



CONCOMBRE | CUCUMIS SATIVUS

KHIYÂR VAZARNEH | GUR/K/002


Origine : Iran. De type cornichon. Fruits verts à peau lisse étant parfois un peu bosselés. À maturité, les fruits sont de couleur jaune clair à brunâtre. Feuilles vert foncé. Fleurs jaunes. À maturité, env. 15 cm de long et jusqu'à env. 8 cm d'épaisseur.



COURGE DE SIAM | CUCURBITA FICIFOLIA

COCOS / MARMELADE | FB-K/C/001

Variété à très forte croissance. Les fruits ont une forme cylindrique, voire ovoïde, et ont une peau verte à taches blanches. Les fruits pèsent env. 2 à 5kg. Rendement très élevé. La chair est blanche et très sucrée. Sa structure ressemble à celle de la noix de coco. Les fruits peuvent être conservés plus d'une année. Plantes très saines. Maturation tardive.



ÉPEAUTRE | TRITICUM AESTIVUM SSP. SPELTA

VON RECHSBERGER BRAUNER WINTERSPELZ | DIN/V/001

Longs épis à pointe courte aristée, de couleur jaune brunâtre, courbés.



8

ÉPEAUTRE | TRITICUM AESTIVUM SSP. SPELTA

SCHWARZER BEHAARTER WINTERKOLBENDINKEL AUS NÖRDLINGEN | DIN/S/001

Balles velues, non aristées ; variété robuste ; épis penchés ; couleur des épis et des tiges qui varie, quelque peu hétérogène.



ÉPEAUTRE | TRITICUM AESTIVUM SSP. SPELTA

WEISSER WINTERGRANNENDINKEL AUS HOHENHEIM | DIN/W/001

Épis blanc-jaune, penchés, aristés, de longueur moyenne.



9

FÈVE | VICIA FABA

BAD SALZIG | PU-B/B/001


Variété locale de hauteur moyenne provenant de la région du Rhin moyen, avec gousses poussant vers le haut contenant des grains brunâtres de petite et moyenne taille. Fleurs décoratives blanche et rose à taches noires. Consommation des grains jeunes comme légume, ou à utiliser séchés pour les soupes.



HARICOT À RAMES | PHASEOLUS VULGARIS

NIEDERHOSENBACH | ST-B/N/001


Origine : Luxembourg, et Niederhosenbach, canton de Birkenfeld situé dans le Land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne. Fleurs violet clair. Feuilles et tiges de couleur vert. Bord des feuilles entier. Haricots verts et plats. 8 à 12 haricots par tige.



HARICOT À RAMES | PHASEOLUS VULGARIS

LESK BOHNE | ST-B/L/002

Haricot fin, haricot beurre. Gousses jaune pâle, d'env. 17 cm de long, avec motifs rougeâtres. Haricots ronds de couleur gris-brun. Feuilles vert clair. Origine : Moravie vers 1900.



HARICOT À RAMES | PHASEOLUS VULGARIS

KLOSTERFRAUEN | ST-B/K/002


Cette variété ancienne a visiblement été modifiée en Suisse entre 1912 et 1957. Les gousses vertes sont larges, mais courtes. Longueur des cosses d'env. 12 cm. Forme ronde-ovale. Sans fils. Fleurs blanches. Haricot sec et haricot vert. Plantes à forte croissance. Maturation plutôt tardive.



HARICOT À RAMES | PHASEOLUS VULGARIS

KLEINE WEISSE AUS ISTANBUL | ST-B/K/002


Cette variété a été trouvée sur un marché d'Istanbul en Turquie. Le petit grain de forme ovoïde est blanc et mesure env. 11x6 mm. À l'extrémité de la partie longitudinale, le grain est souvent un peu carré. Peut atteindre jusqu'à 3 m de hauteur. Gousses faisant entre 9 et 12 cm de long.



LAITUE CULTIVÉE | LACTUCA SATIVA

AUGSPURGER | SAL/A/001


Une famille Amish du nom de Augspurger cultive cette variété de salade très tendre à maturation précoce depuis de nombreuses générations. Développement plutôt lent. Salade de type multifeuilles, dont les feuilles de même taille tombent à la coupe car aucune tête ne se forme. Les feuilles vert clair poussent de façon serrée vers le haut et ont surface légèrement ondulée rappelant la salade feuille de chêne. Montaison tardive et saveur légèrement amère.



LAITUE CULTIVÉE | LACTUCA SATIVA

ROMAINE RED COS | SAL/R/001


Origine : salade romaine de Gatersleben. Feuilles ovales vert et rouge au bord entier. De couleur rougeâtre plus intense aux extrémités. Donne de nombreuses feuilles externes. Pomme d'une hauteur d'env. 30 cm. Pomme d'une largeur d'env. 10 cm. Diamètre de la plante, feuille externe incluse, d'env. 30 cm. Donne des pommes en partie lâches. Sélectionner les pommes fermes et fermées. Culture du printemps à l'été. Goût agréable avec une légère note amère. Nervures délicieusement croquantes, feuilles tendres.



LAITUE CULTIVÉE | LACTUCA SATIVA

DUNKELGRÜNER OSTSTEIRISCHER | SAL/D/001


Feuilles vert foncé brillant. Feuilles cloquées et légèrement ondulées sur les bords. La variété ne forme qu'une petite tête. Pour obtenir des têtes plus fermes, la variété doit être semée avant la fin du mois de mai. Un ensemencement plus tardif permet de la consommer plutôt comme une salade à tondre pendant l'été. Variété à graines blanches. Saveur délicieuse et consistance « croustillante ». Est cultivée depuis les années 1930 dans la région de la Styrie-du-Sud-Est en Autriche.



LAITUE CULTIVÉE | LACTUCA SATIVA

PARRIS WHITE COS | SAL/P/001

Déjà répertoriée dans une liste de prix de Vilmorin-Andrieux en 1856. Feuilles vert gris de forme ovoïde. Feuilles fermes. Diamètre de la plante d'env. 45 cm. Ne se ferme pas d'elle-même.



MÉLISSE OFFICINALE | MELISSA OFFICINALIS

OHNE NAME NR 062 | ZI-M/O/001

Originaire de l'est de la région méditerranéenne et de l'ouest de l'Asie. Plante herbacée vivace pouvant durer 25-30 ans. Peut atteindre jusqu'à env. 90-100 cm. Parfum citronné intense. Est utilisée comme épice et comme plante médicinale.



MELON | CUCUMIS MELO

STREITS FREILAND GRÜN GENETZTE | ZU-M/S/001

Melon cultivé en plein champ dont la maturation est assez précoce. Petits fruits ronds d'env. 10-12 cm de diamètre. Peau présentant des nervures longitudinales bien visibles. Chair verdâtre. Prend une teinte orange lorsqu'il est très mûr. Très sucré. Les plantes ont une croissance faible à moyenne. Maturation mi-tardive. Très bon rendement. La variété est adaptée à une culture en plein champ et dans des serres chauffées.



MILLET COMMUN | PANICUM MILIACEUM

EDELBLUT | RI-H/E/001

Variété locale d'origine slovène. Forme des graines rouges foncées. Cette plante peut atteindre une hauteur de 60 cm et n'a pas besoin de support de croissance. Récolte importante non homogène dans le stade de maturité, car les épis mûrissent de façon irrégulière.



OCA DU PÉROU | OXALIS TUBEROSA

SORTENMISCHUNG | OCA/S/001

Originaire d'Amérique du Sud. Apparenté aux Oxalis. Jusqu'à 10 cm de longueur, d'une épaisseur d'un pouce environ, comestible et fortement oxalique. A des tubercules de différentes couleurs. Les plantes commencent seulement avec la formation de tubercules en automne (jours courts) – pour favoriser leur croissance, vous devriez donc les protéger aussi longtemps que possible du gel. Culture et hivernage similaire à ceux de la pomme de terre. Aime les endroits humides, même partiellement ombragés. Peut être préparé à la vapeur, cuit ou cru. Cependant, lorsqu'il est consommé cru, le tubercule doit être désacidifié en exposant les tubercules à la lumière du soleil. C'est ainsi que le tubercule développe un goût sucré.



PIMENT | CAPSICUM ANNUUM

SWEET JULIE | PAP/S/001


Variété locale libanaise. Disponible en Europe sous le nom de «Sweet Julie». Mini-poivron à petits fruits, qui passe d'une couleur vert clair à l'orange en passant par le jaune clair pendant la maturation. Très bon rendement et maturation très précoce. Bien adapté pour une culture en serre et pour la culture en plein champ dans des endroits chauds.



RADIS | RAPHANUS SATIVUS VAR. SATIVUS

GELBES RADIESCHEN | RAD/G/001

Tubercules ronds, voire ovales, étant plutôt grands. Peau des tubercules jaune à l'aspect un peu réticulé et légèrement brunâtre. Chair blanche. Variété locale ancienne.



RUE OFFICINALE | RUTA GRAVEOLENS

OHNE NAME NR 057 | WEI/O/001

Demi-arbuste atteignant une hauteur jusqu'à 1 m. Feuillage finement divisé de couleur bleu-vert. Fleur jaune. Originaire d'Europe du Sud et de la Méditerranée orientale. Peut être utilisée comme épice et plante ornementale. Le nom de la variété « Ohne Name Nr. 057 » est une désignation originale.



SCORSONÈRE D'ESPAGNE | SCORZONERA HISPANICA

EINJÄHRIGE RIESEN | SC-W/E/001


Variété ancienne faisant partie des premières espèces étant pour la première fois désignées par un nom en 1904. Le nom de la variété renvoie à la méthode de culture annuelle utilisée aujourd'hui. Autrefois, les salsifis noirs n'étant souvent récoltés que la deuxième année. Racines d'environ 25cm de long. Les racines rajeunissent souvent, et ont une forme fuselée relativement variable. Les racines noires ont une forme se terminant en pointe. Chair blanche. Racines dont l'épaisseur va de moyenne à épaisse. Variété à semer le plus tôt possible.



SOUCHET COMESTIBLE | CYPERUS ESCULENTUS

SELEKTION OCHSENHERZ | R-M/S/001


Plante herbacée produisant de nombreux tubercules dans le sol. Les souchets comestibles ont besoin d'un sol chaud, d'un soleil intense, de chaleur et de beaucoup d'eau. Récolte avant les premiers frimas. Après la récolte, laver abondamment puis bien sécher en les étalant dans une pièce. Sécher et conserver à l'air libre (carton ouvert) ou dans des sacs en papier. Les tubercules ont un goût de noisette et peuvent être mangés crus, grillés ou cuits. Hauteur des plantes d'env. 40 cm. Durée de germination très longue. Peut se développer en mauvaise herbe dans les régions ombragées. À cultiver plutôt dans de grands pots donc. À l'inverse de la variété « tubercules ronds », cette espèce présente des tubercules plutôt longs et fins. Le nom de la variété « Selektion Ochsenherz » est une désignation originale.



TOMATE | SOLANUM LYCOPERSICUM

BONER BESTE | TOM/B/006


Tomate productive d'un rouge intense et de forme ronde, voire aplatie, avec 2 à 4 loges étant légèrement nervurées. Fruits pesant env. 150-250 g. Résiste modérément à l'éclatement. Bonne résistance à la découpe. Maturation précoce mais les fruits se ramollissent. Variété ancienne provenant de la région du Rhin en Allemagne, déjà connue dans les années 1930.



TOMATE | SOLANUM LYCOPERSICUM

GREEN ZEBRA | TOM/G/012


Tomate productive d'un vert flamboyant devenant plutôt jaune-verdâtre que vert à maturité. Fruits de taille moyenne pesant 60-120 g. Croissance vigoureuse et feuillage foncé.



TOMATE | SOLANUM LYCOPERSICUM

LONG BEAUTY | TOM/L/004


Cette variété donne des fruits oblongs d'un orange intense d'env. 6-8 cm de long, et env. 4-5 cm d'épaisseur, dont l'extrémité est pointue. Les fruits ont un collet vert en haut. Tomate pour salade modérément ferme pesant env. 80-100 g. Malheureusement assez sensible à la pourriture apicale. Très bon goût et bon rendement. Ne donne que quelques graines de semence. Chair orange avec 2 à 3 loges.



TOMATE | SOLANUM LYCOPERSICUM

ABC POTATO LEAF | TOM/A/004


Feuilles de pomme de terre. En été, les plantes ne présentent encore que des fleurs, des grappes de fruits et des rameaux, on ne voit quasiment pas de feuilles. Peut donner jusqu'à 15 fruits par grappe. Peut atteindre jusqu'à 1,3m. Maturation très précoce, mais dure longtemps. Saveur très sucrée.



TOMATE | SOLANUM LYCOPERSICUM

SOLOTAJZ KAPLEJZ / GOLDTRÖPFCHEN | TOM/S/005


Une variété donnant des fruits jaunes en forme de poire. Les grappes ont entre 20 et 40 fruits. Variété à rendement élevé donnant assez tôt de premiers fruits mûrs.



TOMATE | SOLANUM LYCOPERSICUM

SIZILIANISCHE MINITOMATE OHNE NAME | TOM/S/004

Variété originaire de Sicile. Tomate-cerise donnant de gros fruits rouges d'env. 1-2 cm. Deux loges. Chair rouge. Feuilles de taille normale. Les fruits sont sucrés et juteux. Rendement malheureusement peu élevé.



TOMATE | SOLANUM LYCOPERSICUM

CHERRY BUE | TOM/C/004

Esèce potagère provenant des États-Unis, trouvée dans le jardin d'une maison abandonnée vieille de plus d'un siècle : S'y ressement d'elle-même chaque année. Variété très résistante produisant des petits fruits rouge-orange. Doit son nom à sa découvreuse, Mme Martina, auparavant appelée Büdi, voire plus tard Bü. Comme les claviers aux États-Unis ne comportent pas de touche « ü », son nom est devenu Bue. D'où la tomate devenant « cherry bue ». Forme généralement au niveau des grappes de nouvelles tiges devant être enlevées. Petits fruits ronds et rouges d'env. 1-1,5 cm de diamètre. Fruits peuvent rester accrochés longtemps aux grappes, permettant la récolte de tomates en grappe.



TOMATILLE | PHYSALIS PHILADELPHICA

GROSSE GRÜNE | TO-T/G/001

Jolis gros fruits verts de forme ronde, voire aplatie, devenant vert jaunâtre à maturité. Les fruits sont comme des lampions à cinq côtés. Très bon rendement et délicieux.



VIGNE MADÈRE | ANREDERA CORDIFOLIA

OHNE NAME NR 050 | BAS-K/O/001

Plante grimpante et tubéreuse à feuilles grasses proche du baselle (épinard de Malabar). Grimpe jusqu'à environ 2,5m de haut. Les tubercules et les feuilles sont comestibles. Les fleurs dégagent une odeur rappelant le réséda. Récolte des tubercules à la fin de l'automne après les premières gelées. Ne résiste pas à l'hiver et c'est pourquoi pendant l'hiver, les tubercules doivent être conservés dans un endroit frais, sec et ouvert. Le nom de la variété « Ohne Name Nr. 050 » est une désignation originale.



TOMATILLE | PHYSALIS PHILADELPHICA

PURPLE DE MILPA | TO-T/P/001

Sur les grandes plantes en saillie, c'est dans des lanternes à la chair ferme et de stockage facile, que poussent des baies rondes. Les fruits sont mûrs quand les lanternes s'ouvrent ou tombent, respectivement lorsque les baies violettes n'ont plus de couleur de base verte. Les fruits sont comestibles crus, mais leur arôme spécial ne se déploie que lorsqu'ils sont cuits par exemple sucré comme une compote ou épicé avec de l'ail. Les plantes aiment un climat sec et chaud et mûrissent même dans des endroits défavorables.



Récolte/Floraion
Plantation
Semis direct
Préculture

Topographic map of Luxembourg showing the Alzette river, the Abbaye de Neumünster, and the Plateau du Rham. The map includes labels for 'Klouschtergaart', 'Conseil d'Etat', 'Rue Sosthène Weis', 'Rue Plaetis', 'Rue de Münster', 'Rue du Rham', and 'Trèves'. A green box highlights the 'Accès: Um Stierchen' near the river. The map is sourced from the Ville de Luxembourg - Service de la Topographie et de la Géomatique.

© Ville de Luxembourg - Service de la Topographie et de la Géomatique
Fond de Plan: Extrait de la Carte Topographique 1:5000 (version allégée)
carte interactive: www.topographie.lu

CONTACT

VILLE DE LUXEMBOURG

Service des parcs – Station horticole

132, rue de Reckenthal

L-2410 Luxembourg

T. +352 4796-2867

F. +352 4562-69

Email: parcs@vdl.lu

Plus d'infos sur: klouschtergaart.vdl.lu

Alle Fotos und Texte wurden von Steve Schwartz zur Verfügung gestellt.

Jede Verwertung oder Nutzung der Fotos oder Texte unterliegen deshalb einer vorherigen Absprache seinerseits.

Das Ausgangsmaterial zum Aufbau der Samenbank des Klouschtergaart wurde vom Kraizschouschteschgaart zur Verfügung gestellt.

Literature:

BINGENHEIMER SAATGUT: Samenfeste Sorten

FRITZ / STOLZ: Gemüsebau – Handbuch des Erwerbgärtners

GÄRTNEREI NATURWUCHS: Aussergewöhnliches für Ihren Garten

HEISTINGER: Handbuch Samengärtnerei

KRAIZSCHOUSCHTESCHGAART: Gemüsegarten der Vielfalt

KRUG, H.: Gemüseproduktion – Ein Lehr und Nachschlagewerk für Studium und Praxis

SERENA / SUANJAK / PEDRAZZETTI / BRECHBÜHL: Das Lexikon der alten Gemüsesorten

